

Dr. Juan Pablo A. Valadez Murillo
DGP 10015665
Correo: dr.juanpablovaladez@gmail.com
Cel: 3314103698



Escucha la vida

Recibo a Patricia Colin Flores de 47 años quien es enviada por el Dr. Hugo Anzaldo por hipoacusia quien cuenta con los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS.

Ocupación: Hogar; Ototóxicos y Exposición a ruido: Negados.

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:

Antecedente de familiares con vértigo o hipoacusia antes de los 40 años preguntados y negados.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS.

Niega enfermedades crónico-degenerativas, cirugías, infecciones y demás Antecedentes de importancia para padecimiento actual, preguntados y negados.

PADECIMIENTO ACTUAL.

Acude por hipoacusia bilateral de predominio derecho de 2 años evolución, persistente de inicio insidioso con evolución lentamente progresivo.

EXPLORACION FISICA

Encuentro a femenino con edad aparente a la edad cronológica, buena coloración tegumentaria, funciones mentales superiores conservadas. Conducta auditiva de hipoacusia superficial.

Se realizan los siguientes estudios:

OTOSCOPIA:

OD: Pabellón auricular de características e implantación normales. Conducto auditivo externo permeable. Membrana timpánica íntegra.


OI: Pabellón auricular de características e implantación normales. Conducto auditivo externo permeable. Membrana timpánica íntegra.

ACUMETRIA

Umbral simétrico, Weber central, Rinne positivo bilateral.

TIMPANOMETRIA:


se realiza timpanometria obteniendo curva tipo A de acuerdo a la clasificación de Jerger con los siguientes valores:



IMPEDANCIOMETRIA		
VALORES	O.D.	O.I.
Compliancia (ml)	.4	.4
Presión (daPa)	16	-27
Gradiente (ml)	102	77
Volumen (ml)	1.4	1.3
TIPO DE CURVA (JERGER)	A	A




AUDIMETRIA TONAL Y OSEA:



OD: Hipoacusia moderada tipo neurosensorial
 OI: Hipoacusia moderada tipo neurosensorial

LOGOaudiometria:



OD: Máxima discriminación fonémica al 80% a los 60 y 70 dB
 OI: Máxima discriminación fonémica al 80% a los 60 y 70 dB

Dr. Juan Pablo A. Valadez Murillo
DGP 10015665
Correo: dr.juanpablovaladez@gmail.com
Cel: 3314103698



Escucha la vida

CONCLUSIONES:

Paciente con hipoacusia neurosensorial moderada bilateral de etiología indeterminada.

PLAN:

1. Se sugiere uso de Auxiliares Auditivos programables bilaterales
2. Cuidados generales de audición
3. Control semestral audiométrico (IMPORTANTE).

*Dr. Juan Pablo Alejandro
Valadez Murillo
Universidad de Guayaquil
DGP 10015665*

CUIDADOS GENERALES DE AUDICIÓN:

- EVITE LUGARES CON MUCHO RUIDO: EVITE EL USO PROLONGADO DE AMBIENTES RUIDOSOS Y EL USO DE AUDIFONOS
- NO USE COTONETES: LOS OIDOS TIENE UN MECANISMO NATURAL DE AUTOLIMPIEZA Y BASTA CON EL BAÑO DIARIO POR LO QUE NO DEBE INTRODUCIRSE COTONETES, PASADORES, LLAVES O NINGUN OTRO OBJETO
- CUALQUIER CUADRO GRIPAL PUEDE COMPLICARSE POR LO QUE ACUDA A SU MEDICO PARA EVITAR COMPLICACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A SUS OIDOS
- CONTROLE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS: EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA ENFERMEDAD CRONICA (DIABETES, HPERTENSION, COLESTEROL/TRIGLICERIDOS) ES IMPORTANTE TENERLOS CONTROLADOS PARA EVITAR LA DEGENERACION DE SU AUDICION
- NO USAR MEDICAMENTOS QUE PUEDAN AFECTAR SU AUDICION O EQUILIBRIO, POR LO QUE CUANDO ACUDA AL MEDICO NOTIFIQUE TRATAR EVITAR LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS Y/O SUSTANCIAS:

ANTIBIOTICOS: AMIKACINA, NEOMICINA, POLIMIXINA B, ESTREPTOMICINA,
DIHIDROESTREPTOMICINA,
KANAMICINA, GENTAMICINA, VANCOMICINA, VIOMICINA, TOBRAMICINA,
NETROMICINA

DIURETICOS: ACIDO ETACRINICO Y FUROSEMIDA

FARMACOS: SALICILATOS, CARBAMAZEPINA, BARBITURICOS, DIFENILHIDATOINA,
ETOSUXIMIDA

SUSTANCIAS QUIMICAS: QUININA, TABACO, ALCOHOL